

BOLETIM DE MONITORAMENTO DA
BACIA DO ALTO PARAGUAI

v.5, n. 03, mar. 2010

República Federativa do Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva

Presidente

Ministério do Meio Ambiente – MMA

Carlos Minc Baumfeld

Ministro

Agência Nacional de Águas – ANA

Diretoria Colegiada

Vicente Andreu Guillo – Diretor-Presidente

Dalvino Franca


João Gilberto Lotufo

Paulo Varella

Superintendência de Usos Múltiplos

Joaquim Guedes Corrêa Gondim Filho

BOLETIM DE MONITORAMENTO DA BACIA DO ALTO PARAGUAI



Comitê de Editoração

Presidente: João Gilberto Lotufo Conejo

Membros:

Joaquim Guedes Corrêa Gondim Filho

Ney Maranhão

Ricardo Medeiros de Andrade

Reginaldo Pereira Miguel

Preparador de originais: Antonio Augusto Borges de Lima

Revisor de Texto: Adalberto Meller

Projeto gráfico: SUM

Os conceitos emitidos nesta publicação são de inteira responsabilidade dos autores.

Exemplares desta publicação podem ser solicitados para:

Agência Nacional de Águas – ANA

Centro de Documentação

Setor Policial Sul– Área 5, Quadra 3, Bloco L

70610-200 Brasília – DF

Fone: (61) 2109-5396

Fax: (61) 2109-5265

Endereço eletrônico: <http://www.ana.gov.br>

Correio eletrônico: cedoc@ana.gov.br

©Agência Nacional de Águas 2010

Todos os direitos reservados.

É permitida a reprodução de dados e de informações contidas nesta publicação, desde que citada a fonte.

Catálogo na fonte – CEDOC – Biblioteca

A265b Agência Nacional de Águas (Brasil)
Boletim de Monitoramento da Bacia do Alto Paraguai /
Agência Nacional de Águas, Superintendência de Usos
Múltiplos.
Brasília : ANA, 2010.
Mensal.
1. Administração Pública. 2. Agência Reguladora. 3. Relatório.
4. Agência Nacional de Águas (Brasil).
CDU 556.18 (81) (047.32)

SUMÁRIO:

| | |
|--|----|
| - Bacia do Rio Paraguai | 06 |
| - Caracterização pelo posto fluviométrico de Ladário | 07 |
| - Estações de Monitoramento..... | 09 |
| Ladário..... | 10 |
| Cuiabá..... | 11 |
| São Jerônimo..... | 12 |
| Cáceres..... | 13 |
| Porto Esperança..... | 14 |
| Porto Murtinho..... | 15 |
| Estrada MT-738..... | 16 |
| - Reservatório de Manso..... | 17 |
| - Precipitação Média Mensal..... | 18 |
| - Previsão para o próximo trimestre..... | 21 |

Bacia do Rio Paraguai

O rio Paraguai é um dos principais tributários da Bacia do Prata, a segunda maior bacia da América do Sul, superada apenas pela bacia do Amazonas e conta com 3.100.000 km² em sua totalidade. De todos os rios que formam a bacia do rio da Prata, o rio Paraguai é o que penetra mais em direção ao centro do continente.

A Bacia do Alto Paraguai – BAP tem três regiões bastante distintas: o Planalto, o Pantanal e o Chaco. O Planalto é uma região relativamente alta, com cotas acima de 200 m, podendo atingir até 1400 m, localizada na região leste da bacia, quase inteiramente em território brasileiro, onde a drenagem é bem definida e convergente.

O Pantanal é uma região baixa, localizada no centro da bacia, onde os rios inundam a planície e alimentam um intrincado sistema de drenagem que inclui lagos extensos, cursos d'água divergentes e áreas de escoamento e inundação sazonal. A região do Pantanal apresenta cotas entre 80 e 150 m e foi formada pelo rebaixamento de uma grande região, simultaneamente ao surgimento da Cordilheira dos Andes (Silva, 1984). A curva de nível de 200 m de altitude corresponde, aproximadamente, aos limites entre a planície do Pantanal e as escarpas, montanhas e chapadas do Planalto.

As isoietas da **Figura 1** caracterizam a precipitação média anual da porção brasileira da BAP. Nota-se uma maior incidência pluviométrica nas áreas norte, nordeste e leste da porção brasileira da BAP, que são regiões de cabeceiras de rios constituintes da bacia. São mostrados também gráficos de precipitação média mensal em várias estações da bacia. O período de novembro a março caracteriza-se como o mais chuvoso.

A **Figura 2** ilustra as vazões médias anuais em várias estações da BAP. Nota-se uma considerável defasagem entre as vazões das estações localizadas nas cabeceiras e as demais. Nas cabeceiras observa-se uma resposta rápida às precipitações e os picos ocorrem no período chuvoso. Já as estações mais a jusante apresentam picos de vazões médias anuais no período de estiagem. Essa defasagem deve-se às características morfodinâmicas da bacia, com grandes áreas de alagamento que funcionam como reservatórios.

Finalmente, o Chaco, localizado a oeste da fronteira do Brasil, é uma região baixa onde a precipitação é inferior a 1000 mm por ano e onde há grandes áreas com drenagem endorréica (sem fluxo de saída natural), que finaliza em banhados ou lagos, ou sem sistema de drenagem definido. Com base na topografia, a área de drenagem da BAP, incluindo toda a região de Chaco, seria de 600.000 km², aproximadamente. Entretanto, por ser o Chaco uma área endorréica, é freqüentemente desconsiderada para efeito de contribuição hídrica, o que resulta numa área de drenagem de cerca de 400.000 km² para a BAP.

Caracterização pela estação fluviométrica de Ladário

Dentre todas as estações fluviométricas da Bacia do Alto Paraguai, a estação de Ladário, localizada no 6º Distrito Naval da Marinha do Brasil em Mato Grosso do Sul, dispõe da série de níveis mais extensa, com dados desde o ano de 1900 até os dias de hoje. Além da extensa série, sua localização é estratégica, pois controla cerca de 81% da vazão média de saída do território brasileiro, tornando-a fundamental na caracterização do regime hidrológico da Bacia do Alto Paraguai e possibilitando mesmo a caracterização de um dado período como sendo de seca ou de cheia no Pantanal.

Essa condição é reforçada pela homogeneidade relativa na distribuição sazonal das vazões na bacia, o que fica refletido no registro de Ladário, apesar das imensas áreas envolvidas e da diversidade geomorfológica, sobretudo considerando as cabeceiras e o Pantanal.




Figura 1 - Precipitação média anual acumulada na porção brasileira da bacia




Figura 2 – Vazões médias mensais e anuais em algumas estações da bacia

Ladário

Ao longo do mês de fevereiro de 2010 os níveis d'água registrados no rio Paraguai, na estação de Ladário, mantiveram-se entre a curva de permanência de 10% e a curva de permanência de 50%.

No dia 28 de fevereiro de 2010, o nível da água do rio Paraguai no posto de Ladário era de 3,13 m.



PREVENÇÃO DE EVENTOS CRÍTICOS NO PANTANAL Rio Paraguai em Ladário





Figura 4 – Gráficos de permanência de cotas, cotas máximas, mínimas e observadas no rio Paraguai, em Ladário.

Cuiabá

Durante o mês de fevereiro de 2010 foram registrados cotas cujos valores oscilaram muito, indo de valores abaixo da curva de permanência de 90% a valores próximos da curva de máximos

No dia 28 de fevereiro de 2010 a cota na estação de Cuiabá foi 2,90 m valor que se encontra entre as curvas de permanência de 50% e de 90%.



PREVENÇÃO DE EVENTOS CRÍTICOS NO PANTANAL Rio Cuiabá em Cuiabá




Figura 5 – Gráficos de permanência de cotas, cotas máximas, mínimas e observadas no rio Cuiabá, em Cuiabá.

São Jerônimo

Durante o mês de fevereiro de 2010 os níveis d'água registrados, do rio Piquiri, na estação fluviométrica de São Jerônimo estiveram entre as curvas de permanência de 10% e a de 90% sempre com valores próximos da curva de permanência de 50%.

No dia 28 de fevereiro de 2010 o nível d'água observado no rio Piquiri em São Jerônimo era de 3,56 m.



PREVENÇÃO DE EVENTOS CRÍTICOS NO PANTANAL Rio Piquiri em São Jerônimo





Figura 6 - Gráficos de permanência de cotas, cotas máximas, mínimas e observadas no rio Piquiri, em São Jerônimo.

Cáceres

Ao longo do mês de fevereiro de 2010 os dados registrados de nível d'água do rio Paraguai, em Cáceres, apresentaram valores entre a curva de permanência de 90% e a curva de máximos históricos. Vale chamar atenção à rápida ascensão ocorrida que levou valores de cota, entre a curva de permanência de 50% e a curva de permanência de 90%, a valores próximos da curva de máximos históricos em somente 7 dias.

Em 28 de fevereiro de 2010 o nível do rio Paraguai na estação de Cáceres observado foi 5,64 m.



PREVENÇÃO DE EVENTOS CRÍTICOS NO PANTANAL Rio Paraguai em Cáceres




Figura 7 - Gráficos de permanência de cotas, cotas máximas, mínimas e observadas no rio Paraguai, em Cáceres.

Porto Esperança

Os dados de cota observados em fevereiro de 2010 na estação Porto Esperança, no rio Paraguai, estiveram entre a curva de permanência de 10% e a curva de permanência de 90%.

No dia 28 de fevereiro de 2010, o nível da água do rio Paraguai na estação de Porto Esperança era de 3,48 m.



PREVENÇÃO DE EVENTOS CRÍTICOS NO PANTANAL Rio Paraguai em Porto Esperança





Figura 8 - Gráficos de permanência de cotas, cotas máximas, mínimas e observadas no rio Paraguai, em Porto Esperança.

Porto Murtinho

O rio Paraguai na estação de Porto Murtinho apresentou, durante o mês de fevereiro de 2010 registros de níveis d'água que se mantiveram entre a curva de permanência de 50 % e a curva de permanência de 10% com valores bem próximos a essa última curva no fim do mês.

No dia 28 de fevereiro de 2010, a cota registrada na estação de Porto Murtinho foi de 5,60 m.



PREVENÇÃO DE EVENTOS CRÍTICOS NO PANTANAL Rio Paraguai em Porto Murtinho





Figura 9 - Gráficos de permanência de cotas, cotas máximas, mínimas e observadas no rio Paraguai, em Porto Murtinho.

Estrada MT-738

Durante o mês de fevereiro de 2010, o rio Miranda, na estação de Estrada MT-738, registrou valores que oscilaram bastante. Foram observados valores entre a curva de permanência de 90% a valores acima da curva de máximos históricos (dias 20 e 21).

Em 28 de fevereiro de 2010 o nível d'água registrado no rio Miranda na estação fluviométrica Estrada MT-738 era de 3,00 m.



PREVENÇÃO DE EVENTOS CRÍTICOS NO PANTANAL Rio Miranda na Estrada MT-738




Figura 10 - Gráficos de permanência de cotas, cotas máximas, mínimas e observadas no rio Miranda, na Ponte MT – 738.

Reservatório de Manso

Durante o mês de fevereiro de 2010, a vazão afluente média ao reservatório do aproveitamento múltiplo de Manso foi de 333 m³/s. A vazão defluente média verificada na APM Manso no mesmo período foi de 152 m³/s. No dia 28 de fevereiro de 2010 a vazão defluente em Manso era 117 m³/s.

As figuras 11 e 12 ilustram as vazões na UHE Manso.




Figura 11 – Vazões na UHE Manso de janeiro de 2009 a fevereiro de 2010




Figura 12 – Vazões na UHE Manso para o mês de fevereiro de 2010

Em fevereiro houve um aumento do volume útil do reservatório Manso. No dia 28 de fevereiro de 2010, o reservatório de Manso apresentava 80,7% do seu volume útil. A Figura 13 e 14 ilustram a evolução do volume útil.




Figura 13 – Volume Útil na UHE Manso de janeiro de 2009 a fevereiro de 2010




Figura 14 – Volume Útil na UHE Manso para o mês de fevereiro de 2010

Precipitação Média Mensal

Em janeiro de 2010, a precipitação observada na bacia do Alto Paraguai foi superior à média histórica para o período. Houve registros de precipitação acima da média em boa parte da bacia, especialmente no nordeste no noroeste.

A precipitação observada para o mês de fevereiro foi superior a do mês anterior, com registro de precipitação de 100 a 500mm em toda a bacia. Houve registros de precipitações elevadas em praticamente toda a bacia.

As Figuras 15 e 16 ilustram as isoietas de valores acumulados, climatologia e de anomalia de precipitação na BAP para os períodos de 01/01/2010 a 31/01/2010 e 01/02/2010 a 28/02/2010, respectivamente. Já a figura 17 mostra a evolução da precipitação.





Figura 15 - Isoietas de precipitação acumulada, climatologia e de anomalias de precipitação na BAP, no período de 01/01/10 a 31/01/10.

01/02/2010 a 28/02/2010



Fonte de dados:CMCD/NPE-INMET-FUNCEME-LMRS/PB-EMPARN/RN-DMRH/PE
SRHBA/BA-CEPES/SE-SEAG/ES-NMRH/AL,SIMGE-CEMIG/MG-SIMEPAR/PR-CLIMERH/SC

Figura 16 – Isoietas de precipitação acumulada, climatologia e de anomalias de precipitação na BAP, no período de 01/02/10 a 28/02/10.




Figura 17 – Evolução de Precipitação na bacia do Alto Paraguai.

Previsão para o Próximo Trimestre

A previsão climática para os próximos três meses indica que, na maior parte da bacia do Alto Paraguai, os valores de precipitação tendem a ser próximos à média para o período.




Figura 18 – Previsão climática para o trimestre mar / abr / mai.