



BOLETIM DE MONITORAMENTO DA
BACIA DO ALTO PARAGUAI

v.8, n. 06, jun. 2013

República Federativa do Brasil

Dilma Vana Rousseff

Presidenta

Ministério do Meio Ambiente – MMA

Isabella Teixeira - Ministra

Agência Nacional de Águas - ANA

Diretoria Colegiada

Vicente Andreu Guillo (Diretor-Presidente)

Dalvino Troccoli Franca


João Gilberto Lotufo Conejo

Paulo Lopes Varella Neto

Superintendência de Usos Múltiplos e Eventos Críticos

Joaquim Guedes Corrêa Gondim Filho

BOLETIM DE MONITORAMENTO DA BACIA DO ALTO PARAGUAI



Comitê de Editoração

Presidente: João Gilberto Lotufo Conejo

Membros:

Joaquim Guedes Corrêa Gondim Filho

Ricardo Medeiros de Andrade

Reginaldo Pereira Miguel

Preparadora de originais: Priscyla Conti de Mesquita e Priscila Monteiro Gonçalves

Revisor de Texto: Antonio Augusto Borges de Lima

Projeto gráfico: SUM

Os conceitos emitidos nesta publicação são de inteira responsabilidade dos autores.

Exemplares desta publicação podem ser solicitados para:

Agência Nacional de Águas – ANA

Centro de Documentação

Setor Policial Sul– Área 5, Quadra 3, Bloco L

70610-200 Brasília – DF

Fone: (61) 2109-5396

Fax: (61) 2109-5265

Endereço eletrônico: <http://www.ana.gov.br>

Correio eletrônico: cedoc@ana.gov.br

©Agência Nacional de Águas 2013

Todos os direitos reservados.

É permitida a reprodução de dados e de informações contidas nesta publicação, desde que citada a fonte.

Catálogo na fonte – CEDOC – Biblioteca

A265b Agência Nacional de Águas (Brasil)
Boletim de Monitoramento da Bacia do Alto Paraguai /
Agência Nacional de Águas, Superintendência de Usos
Múltiplos e Eventos Críticos.
Brasília : ANA, 2013.
Mensal.
1. Administração Pública. 2. Agência Reguladora. 3. Relatório.
4. Agência Nacional de Águas (Brasil).

CDU 556.18 (81) (047.32)

SUMÁRIO:

- Bacia do Rio Paraguai	06
- Caracterização pela estação fluviométrica de Ladário	07
- Estações de monitoramento.....	09
Ladário.....	10
Cuiabá.....	11
São Jerônimo.....	12
Cáceres.....	13
Porto Esperança.....	14
Porto Murtinho.....	15
Ponte MT-738.....	16
- Reservatório de Manso.....	17
- Precipitação média mensal dos últimos meses.....	19
- Previsão para o próximo trimestre.....	22

Bacia do Rio Paraguai

O rio Paraguai é um dos principais tributários da Bacia do Prata, a segunda maior bacia da América do Sul, superada apenas pela bacia do Amazonas. Sua bacia conta com 3.100.000 km² de área. De todos os rios que formam a bacia do rio da Prata, o rio Paraguai é o que penetra mais em direção ao centro do continente.

A Bacia do Alto Paraguai – BAP possui três regiões bastante distintas: o Planalto, o Pantanal e o Chaco. O Planalto é uma região relativamente alta, com altitude acima de 200 m, podendo atingir até 1400 m, localizada na região leste da bacia, quase inteiramente em território brasileiro. Nessa porção da bacia, a drenagem é bem definida e convergente.

O Pantanal é uma região baixa, localizada no centro da bacia, onde os rios inundam a planície e alimentam um intrincado sistema de drenagem que inclui lagos extensos, cursos d'água divergentes e áreas de escoamento e inundação sazonal. A região do Pantanal apresenta cotas entre 80 e 150 m e foi formada pelo rebaixamento de uma grande região, simultaneamente ao surgimento da Cordilheira dos Andes (Silva, 1984). A curva de nível de 200 m de altitude corresponde, aproximadamente, aos limites entre a planície do Pantanal e as escarpas, montanhas e chapadas do Planalto.

Finalmente, o Chaco, localizado a oeste da fronteira do Brasil, é uma região baixa onde a precipitação é inferior a 1000 mm por ano e onde há grandes áreas com drenagem endorréica (sem fluxo de saída natural), que finaliza em banhados ou lagos, ou sem sistema de drenagem definido. Com base na topografia, a área de drenagem da BAP, incluindo toda a região de Chaco, seria de 600.000 km², aproximadamente. Entretanto, por ser o Chaco uma área endorréica, é frequentemente desconsiderada para efeito de contribuição hídrica, o que resulta em uma área de drenagem referente à BAP igual a cerca de 400.000 km².

As isoietas da **Figura 1** caracterizam a precipitação média anual da porção brasileira da BAP. Nota-se uma maior incidência pluviométrica nas áreas norte, nordeste e leste da porção brasileira da BAP, que são regiões de cabeceiras de rios constituintes da bacia. Na referida figura, são mostrados também gráficos de precipitação média mensal em várias estações da bacia. O período de novembro a março caracteriza-se como o mais chuvoso.

A **Figura 2** ilustra as vazões médias anuais em várias estações da BAP. Nota-se uma considerável defasagem entre as vazões das estações localizadas nas cabeceiras e as demais. Nas cabeceiras, observa-se uma resposta rápida às precipitações e os picos ocorrem no período chuvoso. Já as estações mais a jusante apresentam picos de vazões médias anuais no período de estiagem. Essa defasagem deve-se às características morfodinâmicas da bacia, com grandes áreas de alagamento que funcionam como reservatórios.

Caracterização pela estação fluviométrica de Ladário

Entre todas as estações fluviométricas da Bacia do Alto Paraguai, a estação de Ladário, localizada no 6º Distrito Naval da Marinha do Brasil em Mato Grosso do Sul, dispõe da série de níveis mais extensa, com dados desde o ano de 1900 até os dias de hoje. Além da extensa série, sua localização é estratégica, pois controla cerca de 81% da vazão média de saída do território brasileiro, o que a torna fundamental na caracterização do regime hidrológico da Bacia do Alto Paraguai e possibilita a caracterização de um dado período como sendo de seca ou de cheia no Pantanal.

Essa condição é reforçada pela homogeneidade relativa na distribuição sazonal das vazões na bacia, o que fica refletido no registro de Ladário, apesar das imensas áreas envolvidas e da diversidade geomorfológica, sobretudo considerando as cabeceiras e o Pantanal.




Figura 1 - Precipitação média anual acumulada na porção brasileira da bacia




Figura 2 – Vazões médias mensais e anuais em algumas estações da bacia

Estações de monitoramento

A Figura 3 apresenta a localização das estações fluviométricas utilizadas no monitoramento da bacia do Alto Paraguai. A situação de algumas dessas estações é detalhada a seguir.




Figura 3 – Estações fluviométricas de monitoramento da BAP

Ladário

Ao longo do mês de maio de 2013, os níveis d'água registrados no rio Paraguai, na estação de Ladário, mantiveram-se entre a curva de permanência de 90% e a de 50%.

No dia 31 de maio de 2013, o nível da água do rio Paraguai no posto de Ladário era de 354 cm, enquanto a cota com 50% de permanência, para esse dia do ano, é de 432 cm.

Neste mês, a estação de Ladário funcionou em 100% dos dias.



PREVENÇÃO DE EVENTOS CRÍTICOS NO PANTANAL Rio Paraguai em Ladário





Figura 4 – Gráficos de permanência de cotas, cotas máximas, mínimas e observadas no rio Paraguai, em Ladário.

Cuiabá

Durante o mês de maio de 2013, foram registradas cotas cujos valores variaram entre a curva de mínimos históricos e a curva com 90% de permanência na maioria dos dias.

No dia 31 de maio, a cota na estação de Cuiabá foi 52 cm, enquanto a cota com 90% de permanência registrada nesse dia vale 63 cm.

A estação telemétrica de Cuiabá está em manutenção desde 21/02/2013. Desde então, os dados vêm sendo obtidos no sitio eletrônico da Marinha do Brasil (<http://www.mar.mil.br/ssn-6/>).



PREVENÇÃO DE EVENTOS CRÍTICOS NO PANTANAL Rio Cuiabá em Cuiabá




Figura 5 – Gráficos de permanência de cotas, cotas máximas, mínimas e observadas no rio Cuiabá, em Cuiabá.

São Jerônimo

Durante o mês de maio de 2013, os níveis d'água do rio Piquiri registrados na estação fluviométrica de São Jerônimo estiveram entre as curvas com 90% e 10% de permanência.

No dia 31, o nível d'água observado no rio Piquiri em São Jerônimo foi de 255 cm, enquanto a cota com permanência de 50% nesse dia é de 264 cm.

Neste mês, a estação de São Jerônimo funcionou em 100% dos dias.



PREVENÇÃO DE EVENTOS CRÍTICOS NO PANTANAL Rio Piquiri em São Jerônimo





Figura 6 - Gráficos de permanência de cotas, cotas máximas, mínimas e observadas no rio Piquiri, em São Jerônimo.

Cáceres

Ao longo do mês de maio de 2013, os dados registrados de nível d'água do rio Paraguai, em Cáceres, apresentaram valores entre a curva de mínimos históricos e a com 50% de permanência, com exceção dos dias 10, 11, 15 e 16, em que os níveis foram os menores já registrados para esses dias.

No dia 31, o nível observado do rio Paraguai na estação de Cáceres foi 184 cm, enquanto a cota com 90% de permanência desse dia vale 213 cm.

Neste mês, a estação de Cáceres funcionou em 100% dos dias.



PREVENÇÃO DE EVENTOS CRÍTICOS NO PANTANAL Rio Paraguai em Cáceres





Figura 7 - Gráficos de permanência de cotas, cotas máximas, mínimas e observadas no rio Paraguai, em Cáceres.

Porto Esperança

Em maio, os dados de cota transmitidos por essa estação estiveram entre a curva de 90% de permanência e a de 50%.

No dia 31 desse mês, o nível da água do rio Paraguai na estação de Porto Esperança era de 320 cm. A curva de permanência de 50%, nesse dia, atinge a cota de 518 cm.

Neste mês, a estação de Porto Esperança funcionou em 100% dos dias.



PREVENÇÃO DE EVENTOS CRÍTICOS NO PANTANAL Rio Paraguai em Porto Esperança





Figura 8 - Gráficos de permanência de cotas, cotas máximas, mínimas e observadas no rio Paraguai, em Porto Esperança.

Porto Murtinho

O rio Paraguai na estação de Porto Murtinho apresentou, durante o mês de maio de 2013, registros de níveis d'água que se mantiveram entre a curva com 90% de permanência e a curva de permanência de 50%.

No dia 31 de maio, a cota registrada na estação de Porto Murtinho foi de 434 cm, e a cota com 50% de permanência nesse dia é de 508 cm.

Neste mês, a estação de Porto Murtinho funcionou em 100% dos dias.



PREVENÇÃO DE EVENTOS CRÍTICOS NO PANTANAL Rio Paraguai em Porto Murtinho




Figura 9 - Gráficos de permanência de cotas, cotas máximas, mínimas e observadas no rio Paraguai, em Porto Murtinho.

Ponte MT-738

Em maio de 2013, o rio Miranda, na estação Ponte MT-738, registrou valores entre a curva de mínimos e a de máximos históricos.

Em 31 de maio, o nível d'água registrado no rio Miranda na estação fluviométrica Ponte MT-738 foi de 117 cm, enquanto a cota com 90% de permanência neste dia é de 114 cm.

Neste mês, a estação funcionou em 97% dos dias.



PREVENÇÃO DE EVENTOS CRÍTICOS NO PANTANAL Rio Miranda na Ponte MT-738




Figura 10 - Gráficos de permanência de cotas, cotas máximas, mínimas e observadas no rio Miranda, na Ponte MT-738.

Reservatório de Manso

Durante o mês de maio de 2013, a vazão afluente média ao reservatório do aproveitamento múltiplo de Manso foi de 87 m³/s. A vazão defluente média verificada no APM Manso no mesmo período foi de 118 m³/s. No dia 31 de maio de 2013, a vazão defluente em Manso foi 118 m³/s. As figuras 11 e 12 ilustram as vazões na UHE Manso.




Figura 11 – Vazões na UHE Manso de maio de 2011 a maio de 2013.




Figura 12 – Vazões na UHE Manso para o mês de maio de 2013.

Em maio, houve redução do volume útil do reservatório Manso em cerca de 3,8%. No dia 31 de maio de 2013, esse reservatório apresentava 88,9% do seu volume útil. Entre os dias 06 e 07, a variação da vazão defluente ultrapassou a variação máxima de 10m³/s, de acordo com o Inventário das Restrições Hidráulicas Operativas dos Aproveitamentos Hidrelétricos (ONS, 2012). As Figuras 13 e 14 ilustram a evolução do volume útil.




Figura 13 – Volume Útil armazenado na UHE Manso de maio de 2011 a maio de 2013.




Figura 14 – Volume Útil armazenado na UHE Manso para o mês de maio de 2013.

Precipitação média mensal dos últimos meses

No mês de abril, os volumes de chuva ficaram acima da normalidade apenas no sul e nordeste da bacia do Alto Paraguai. Nas demais áreas, os acumulados variaram de normal a ligeiramente abaixo da média. De acordo com o gráfico de anomalia de precipitação (imagem inferior), entre 01/04/2013 e 30/04/2013, os desvios positivos ultrapassaram os 100 mm na parte sul da bacia, enquanto os desvios negativos variaram, em média, de 10 a 50 mm.





Figura 15 – Precipitação mensal acumulada, média climatológica e anomalia de precipitação na BAP, no período de 01/04/13 a 30/04/13.

Os volumes de chuva em maio de 2013 ficaram abaixo da normalidade em praticamente toda a área da bacia do Alto Paraguai, com exceção da parte oeste, onde os totais mensais registrados ficaram em torno da média climatológica. De acordo com o gráfico de anomalia de precipitação (imagem inferior), entre 01/05/2013 e 31/05/2013, os desvios negativos variaram, em média, de 10 a 100 mm.



**Fonte de dados:CMCD/INPE-INMET-FUNCEME-LMRS/PB-EMPARN/RN-DMRH/PE
SRHBA/BA-CEPES/SE-SEAG/ES-NMRH/AL,SINIG-CENIG/MG-SINEPAR/PR-CLMERH/SC**

Figura 16 – Precipitação mensal acumulada, média climatológica e anomalia de precipitação na BAP, no período de 01/05/13 a 31/05/13.

As figuras 17 e 18, a seguir, mostram os volumes de chuva acumulada mensal em 2013 nas estações de Corumbá/MS e Cáceres/MT, respectivamente. Observa-se que enquanto os acumulados de chuva registrados no mês de maio em Corumbá/MS ficaram próximos à normal climatológica, em Cáceres/MT os totais mensais ficaram ligeiramente abaixo da média.




Figura 17 - Precipitação acumulada mensal em 2013 X Média climatológica (61-90) em Corumbá/MS





Figura 18 - Precipitação acumulada mensal em 2013 X Média climatológica (61-90) em Cáceres/MT

Na Figura 19 – Evolução da Precipitação Média na Bacia –, observa-se que a precipitação média registrada na bacia como um todo, em maio de 2013, ficou abaixo da média de longo termo do período.




Fonte: CPTEC-INPE

Figura 19 – Evolução da Precipitação Média na Bacia do Alto Paraguai.

Previsão para o Próximo Trimestre

A previsão climática para os próximos três meses indica igual probabilidade (33%) de ocorrência de precipitação nas três categorias consideradas (normal, acima e abaixo da normalidade) na área da bacia do Alto Paraguai.



Fonte: CPTEC-INPE

Figura 20 – Previsão climática para o trimestre jun / jul / ago de 2013.