



BOLETIM DE MONITORAMENTO DA
BACIA DO ALTO PARAGUAI

v.11, n. 11, novembro 2017

República Federativa do Brasil

Michel Temer

Presidente da República

Ministério do Meio Ambiente – MMA

José Sarney Filho

Ministro

Agência Nacional de Águas - ANA

Diretoria Colegiada

Vicente Andreu Guillo (Diretor-Presidente)

João Gilberto Lotufo Conejo


Gisela Damm Forattini

Ney Maranhão

Superintendência de Operações e Eventos Críticos

Joaquim Guedes Corrêa Gondim Filho

BOLETIM DE MONITORAMENTO DA BACIA DO ALTO PARAGUAI



Comitê de Editoração

Presidente: João Gilberto Lotufo Conejo

Membros:

Joaquim Guedes Corrêa Gondim Filho

Ricardo Medeiros de Andrade

Reginaldo Pereira Miguel

Sérgio Rodrigues Ayrimoraes Soares

Preparadores de originais: Kellen Souza de Oliveira Larrosa e Maria Leonor Baptista Esteves

Revisor de Texto: Diego Liz Pena

Projeto gráfico: SOE

Os conceitos emitidos nesta publicação são de inteira responsabilidade dos autores.

Exemplares desta publicação podem ser solicitados para:

Agência Nacional de Águas – ANA

Centro de Documentação

Setor Policial Sul– Área 5, Quadra 3, Bloco L

70610-200 Brasília – DF

Fone: (61) 2109-5396

Fax: (61) 2109-5265

Endereço eletrônico: <http://www.ana.gov.br>

Correio eletrônico: cedoc@ana.gov.br

©Agência Nacional de Águas 2017

Todos os direitos reservados.

É permitida a reprodução de dados e de informações contidas nesta publicação, desde que citada a fonte.

Catálogo na fonte – CEDOC – Biblioteca

A265b Agência Nacional de Águas (Brasil)
Boletim de Monitoramento da Bacia do Alto Paraguai /
Agência Nacional de Águas, Superintendência de Operações e
Eventos Críticos.
Brasília : ANA, 2017.
Mensal.
1. Administração Pública. 2. Agência Reguladora. 3. Relatório.
4. Agência Nacional de Águas (Brasil).

CDU 556.18 (81) (047.32)

SUMÁRIO:

- Bacia do Rio Paraguai	06
- Caracterização pela estação fluviométrica de Ladário	07
- Estações de monitoramento.....	09
Ladário.....	10
Cuiabá.....	11
São Jerônimo.....	12
Cáceres.....	13
Porto Esperança.....	14
Porto Murtinho.....	15
Ponte MT-738.....	16
- Reservatório de Manso.....	17
- Precipitação média mensal dos últimos meses.....	19
- Previsão para o próximo trimestre.....	22

Bacia do Rio Paraguai

O rio Paraguai é um dos principais tributários da Bacia do Prata, a segunda maior bacia da América do Sul, superada apenas pela bacia do Amazonas. Sua bacia conta com 3.100.000 km² de área. De todos os rios que formam a bacia do rio da Prata, o rio Paraguai é o que penetra mais em direção ao centro do continente.

A Bacia do Alto Paraguai – BAP possui três regiões bastante distintas: o Planalto, o Pantanal e o Chaco. O Planalto é uma região relativamente alta, com altitude acima de 200 m, podendo atingir até 1400 m, localizada na região leste da bacia, quase inteiramente em território brasileiro. Nessa porção da bacia, a drenagem é bem definida e convergente.

O Pantanal é uma região baixa, localizada no centro da bacia, onde os rios inundam a planície e alimentam um intrincado sistema de drenagem que inclui lagos extensos, cursos d'água divergentes e áreas de escoamento e inundação sazonal. A região do Pantanal apresenta cotas entre 80 e 150 m e foi formada pelo rebaixamento de uma grande região, simultaneamente ao surgimento da Cordilheira dos Andes (Silva, 1984). A curva de nível de 200 m de altitude corresponde, aproximadamente, aos limites entre a planície do Pantanal e as escarpas, montanhas e chapadas do Planalto.

Finalmente, o Chaco, localizado a oeste da fronteira do Brasil, é uma região baixa onde a precipitação é inferior a 1000 mm por ano e onde há grandes áreas com drenagem endorréica (sem fluxo de saída natural), que finaliza em banhados ou lagos, ou sem sistema de drenagem definido. Com base na topografia, a área de drenagem da BAP, incluindo toda a região de Chaco, seria de 600.000 km², aproximadamente. Entretanto, por ser o Chaco uma área endorréica, é frequentemente desconsiderada para efeito de contribuição hídrica, o que resulta em uma área de drenagem referente à BAP igual a cerca de 400.000 km².

As isoietas da **Figura 1** caracterizam a precipitação média anual da porção brasileira da BAP. Nota-se uma maior incidência pluviométrica nas áreas norte, nordeste e leste da porção brasileira da BAP, que são regiões de cabeceiras de rios constituintes da bacia. Na referida figura, são mostrados também gráficos de precipitação média mensal em várias estações da bacia. O período de novembro a março caracteriza-se como o mais chuvoso.

A **Figura 2** ilustra as vazões médias anuais em várias estações da BAP. Nota-se uma considerável defasagem entre as vazões das estações localizadas nas cabeceiras e as demais. Nas cabeceiras, observa-se uma resposta rápida às precipitações e os picos ocorrem no período chuvoso. Já as estações mais a jusante apresentam picos de vazões médias anuais no período de estiagem. Essa defasagem deve-se às características morfodinâmicas da bacia, com grandes áreas de alagamento que funcionam como reservatórios.

Caracterização pela estação fluviométrica de Ladário

Entre todas as estações fluviométricas da Bacia do Alto Paraguai, a estação de Ladário, localizada no 6º Distrito Naval da Marinha do Brasil em Mato Grosso do Sul, dispõe da série de níveis mais extensa, com dados desde o ano de 1900 até os dias de hoje. Além da extensa série, sua localização é estratégica, pois controla cerca de 81% da vazão média de saída do território brasileiro, o que a torna fundamental na caracterização do regime hidrológico da Bacia do Alto Paraguai e possibilita a caracterização de um dado período como sendo de seca ou de cheia no Pantanal.

Essa condição é reforçada pela homogeneidade relativa na distribuição sazonal das vazões na bacia, o que fica refletido no registro de Ladário, apesar das imensas áreas envolvidas e da diversidade geomorfológica, sobretudo considerando as cabeceiras e o Pantanal.




Figura 1 - Precipitação média anual acumulada na porção brasileira da bacia




Figura 2 – Vazões médias mensais e anuais em algumas estações da bacia

Estações de monitoramento

A Figura 3 apresenta a localização das estações fluviométricas utilizadas no monitoramento da bacia do Alto Paraguai. A situação de algumas dessas estações é detalhada a seguir.





Figura 3 – Estações fluviométricas de monitoramento da BAP

Ladário

Ao longo do mês de outubro de 2017, os níveis d'água registrados no rio Paraguai, na estação de Ladário, apresentavam valores entre as curvas com 10% e 50% de permanência.

No dia 31 de outubro de 2017, o nível da água do rio Paraguai no posto de Ladário foi de 189 cm.



2017 - 66825000 - LADÁRIO (BASE NAVAL) - RIO PARAGUAI - ANA - CPRM - LADÁRIO/MS - 253.000 km²





Figura 4 – Gráficos de permanência de cotas, cotas máximas, mínimas e observadas no rio Paraguai, em Ladário.

Cuiabá

Durante o mês de outubro de 2017, na estação de Cuiabá, foram registradas cotas cujos valores entre a curva com 90% de permanência e a curva de mínimos históricos.

No dia 31 de outubro o nível d'água observado foi de 34 cm.



2017 - 66260001 - CUIABÁ - RIO CUIABÁ - FURNAS - FURNAS - CUIABÁ/MT - 23.500 km²





Figura 5 – Gráficos de permanência de cotas, cotas máximas, mínimas e observadas no rio Cuiabá, em Cuiabá.

São Jerônimo

Durante o mês de outubro de 2017, os níveis d'água do rio Piquiri registrados, na estação fluviométrica de São Jerônimo, estavam entre as curvas com 50% e com 90% de permanência.

No dia 31 de outubro, o nível d'água observado no rio Piquiri em São Jerônimo foi de 201 cm.



2017 - 66600000 - SÃO JERÔNIMO - RIO PIQUIRI - ANA - CPRM - BARÃO DE MELGAÇO/MT - 23.300 km²





Figura 6 - Gráficos de permanência de cotas, cotas máximas, mínimas e observadas no rio Piquiri, em São Jerônimo.

Cáceres

Ao longo do mês de outubro de 2017, os dados registrados de nível d'água do rio Paraguai, em Cáceres, apresentaram valores entre a curva com 50% de permanência e a curva de mínimos históricos.

No dia 31 de outubro, o nível observado do rio Paraguai na estação de Cáceres foi de 117 cm.

A estação fluviométrica de Cáceres, nos dias 1º a 2, teve uma interferência, e, nos outros dias, seguem a normalidade.



2017 - 66070004 - CÁ CERES (DNPVN) - RIO PARAGUAI - ANA - CPRM - CÁ CERES/MT - 32.400 km²





Figura 7 - Gráficos de permanência de cotas, cotas máximas, mínimas e observadas no rio Paraguai, em Cáceres.

Porto Esperança

Durante o mês de outubro de 2017, os dados registrados de nível d'água do rio Paraguai, na estação de Porto Esperança, apresentaram valores entre as curvas com 50 e 90% de permanência.

No dia 31 de outubro, o nível observado do rio Paraguai, na estação de Porto Esperança, foi de 145 cm.



2017 - 66960008 - PORTO ESPERANÇA - RIO PARAGUAI - ANA - CPRM - CORUMBÁ/MS - 371.000 km²





Figura 8 - Gráficos de permanência de cotas, cotas máximas, mínimas e observadas no rio Paraguai, em Porto Esperança.

Porto Murtinho

Os dados da estação fluviométrica de Porto Murtinho não funcionaram.



2017 - 67100000 - PORTO MURTINHO - RIO PARAGUAI - ANA - CPRM - PORTO MURTINHO/MS - 576.000 km²





Figura 9 - Gráficos de permanência de cotas, cotas máximas, mínimas e observadas no rio Paraguai, em Porto Murtinho.

Ponte MT-738

Ao longo do mês de setembro de 2017, rio Miranda, na estação Ponte MT-738, registrou valores entre a curva de máximos históricos e a curva com 50% de permanência.

Em 31 de outubro, o nível de água registrado no rio Miranda na estação fluviométrica Ponte MT-738 foi de 229 cm.



2017 - 66900000 - ESTRADA MT-738 - RIO MIRANDA - ANA - CPRM - BONITO/MS - 11.600 km²




Figura 10 - Gráficos de permanência de cotas, cotas máximas, mínimas e observadas no rio Miranda, na Ponte MT-738.

Reservatório de Manso

Durante o mês de outubro de 2017, a vazão afluente média ao reservatório do aproveitamento múltiplo de Manso foi de 47 m³/s. A vazão defluente média verificada no APM Manso no mesmo período foi de 130 m³/s. No dia 31 de outubro de 2017, a vazão defluente foi de 131 m³/s. As figuras 11 e 12 ilustram as vazões na UHE Manso.




Figura 11 – Vazões na UHE Manso de novembro de 2011 a outubro de 2017.




Figura 12 – Vazões na UHE Manso para o mês de outubro de 2017.

Em outubro de 2017, foi uma redução de 7,49 do volume útil do reservatório Manso. No dia 31 de outubro, esse reservatório apresentava 58,07 do seu volume útil. As Figuras 13 e 14 ilustram a evolução do volume útil.




Figura 13 – Volume Útil armazenado na UHE Manso de novembro de 2011 a outubro de 2017.




Figura 14 – Volume Útil armazenado na UHE Manso para o mês de outubro de 2017.

Precipitação média mensal dos últimos meses

Em setembro de 2017, o acumulado de chuvas na bacia do Alto Paraguai, ficou entre 10 e 50mm. Verificaram-se, contudo, três áreas onde não ocorreu chuva alguma: uma faixa a noroeste, uma pequena área na divisa nordeste da bacia e outra na divisa sudoeste.

Em toda a bacia, as anomalias foram negativas e, do centro para as divisas noroeste e sul, em geral, foram de -10 a -100mm.




Figura 15 – Precipitação mensal acumulada, média climatológica e anomalia de precipitação na BAP, no período.

Fonte: CPTEC.INPE. Disponível em: <http://energia1.cptec.inpe.br/bacias/pt#AParag>. Acessado em: 09/11/2017.

Em outubro de 2017, o acumulado de chuvas na bacia do Alto Paraguai, na metade norte da bacia, variou de 10mm a 100mm,

Na metade sul da bacia, choveu mais, com acumulados de chuva indo de 100mm a 250mm, chegando a 500mm em uma pequena área.

As anomalias foram negativas, na metade norte da bacia, indo de -10mm (na região central norte) a -100mm nas divisas norte e leste. Das divisas em direção ao centro da metade sul da bacia, as anomalias foram positivas, indo de 10mm a 200mm.

01/10/2017 a 31/10/2017




Figura 16 – Precipitação mensal acumulada, média climatológica e anomalia de precipitação na BAP, no período.

Fonte: CPTEC.INPE. Disponível em: <http://energia1.cptec.inpe.br/bacias/pt#AParag>. Acessado em: 09/11/2017.

A figura 17 mostra o volume de chuva acumulada mensal, em 2017, na estação de Poxoréo/MT. Verifica-se que, em outubro de 2017, a precipitação verificada foi bastante inferior à normal climatológica.




Figura 17 - Precipitação acumulada mensal em 2017 x média climatológica (61-90), em Poxoréo/MT. Fonte: INMET. Disponível em: <http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=tempo/graficos> . Acessado em: 09/11/2017.

Figura 18 – Evolução da Precipitação Média, na bacia do Alto Paraguai: observa-se que a precipitação média registrada, na bacia como um todo, em outubro de 2017, ficou bastante próxima da **média de longo termo** do período.




Figura 18 – Evolução da Precipitação Média na Bacia do Alto Paraguai.

Fonte: CPTEC-INPE. Disponível em: <http://energia1.cptec.inpe.br/>. Acessado em: 09/11/2017.

Previsão para o Próximo Trimestre

O consenso, para o trimestre novembro de 2017 a janeiro de 2018 (ND/2017_J/2018), na bacia do Alto Paraguai, apresenta baixa previsibilidade climática sazonal, com igual probabilidade para as três categorias, na maior parte da bacia.

Indica maior probabilidade do total trimestral de chuva ocorrer na categoria dentro da faixa normal climatológica no extremo sul da bacia, com distribuições para as categorias para as categorias acima, dentro e abaixo da faixa normal climatológica de 35%, 40% e 25%.




Figura 19 – Previsão climática para o trimestre nov./2017 a jan./2018.

Fonte: CPTEC-INPE. Disponível em: http://infoclima1.cptec.inpe.br/index_prog.shtml. Acessado em:09/11/2017.